



HECES



Prueba	Tipo de Muestra	Vol.	Rango de Normalidad / Interpretación	Técnica
DIGESTION DE HECES	HECES Refrig 3-6° C <b>FH</b>	10 g.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El examen microscópico de heces para valorar el exceso de grasa (esteatorrea), almidón sin digerir (amilorrea) y la presencia de fibras musculares sin digerir (creatorrea), presenta un elevado índice de falsos negativos y falsos positivos, por lo que se recomienda la realización de pruebas complementarias con el fin de descartar o confirmar procesos de malabsorción, maldigestión, enteropatía perdedora de proteínas, insuficiencia pancreática exocrina.</li> </ul>	Tinciones especiales y observación microscópica.
PARASITOS EN HECES	HECES Refrig. 3-6° C <b>FH</b>	1 g.	<p>Ausencia de huevos, ooquistes y adultos.</p> <p><b>Parásitos más frecuentes en PERROS/GATOS:</b></p> <p><b>Protozoos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Coccidios:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Isospora.</li> <li>Eimeria.</li> <li>Cryptosporidium.</li> <li>Toxoplasma.</li> </ul> </li> <li>Giardia</li> <li>Entamoeba histolytica</li> </ul> <p><b>Nematodos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trichuris</li> <li>Capillaria</li> <li>Toxascaris</li> <li>Toxocara</li> <li>Uncinaria</li> <li>Ancylostoma</li> <li>Dioctophyma</li> <li>Strongiloides</li> </ul> <p><b>Cestodos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cestodos:</li> <li>Dipylidium</li> <li>Taenia</li> <li>Echinococcus</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dado que la eliminación de parásitos a través de las heces puede ser cíclica, para evitar falsos negativos, es recomendable enviar 4 muestras de heces de días consecutivos al laboratorio.</li> <li>Muchos perros y gatos sanos pueden albergar coccidios intestinales, y ya que estos se consideran muy poco patógenos, es cuestionable la importancia clínica de encontrar oocistos de coccidios. La aparición de síntomas por esta infestación se produce en individuos inmunodeprimidos, neonatos o con infecciones concurrentes asociados a condiciones de falta de higiene, sobrepoblación, estrés, etc.</li> </ul>	<p>* Examen directo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Extensión fecal</li> <li>Tinción directa</li> <li>Tinciones especiales</li> </ul> <p>*Examen indirecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Métodos de flotación</li> <li>Métodos de sedimentación</li> </ul>
QUIMOTRIPSINA FECAL	HECES Congel. <b>FH</b>	1 g.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prueba de apoyo para el diagnóstico de la insuficiencia pancreática exocrina. En ningún caso supera el valor diagnóstico de la TLI.</li> <li><b>Disminuida: IPE (&lt;3 U/g).</b></li> </ul>	Espectrofotométrica